

Zadeva: Uporaba starih/novih napotnic za triažni test HPV

Pozdravljeni,

Z uvajanjem novega citološkega izvida, ki upošteva klasifikacijo po Bethesda 2001, v izvidu ne bo več dveh vrst celic, ki sta doslej veljali kot indikacija za triažni test HPV:

- APC ali APM ter
- blaga diskarioza pri ženskah, starih 35 let in več.

Vseeno pa boste še naslednje pol leta ta dva izvida morali upoštevati pri odločanju za test HPV, saj ta test naročite šele 6 mesecev po prejemu izvida.


Zato predlagamo, da pri **teh dveh indikacijah uporabite še staro napotnico** za triažni test HPV, ki še vsebuje besedilo, ki odgovarja tem indikacijam.

Novo napotnico uporabite šele takrat, ko boste test dejansko naročili na osnovi citološkega izvida:

- APC-N;
- AŽC-N;
- PIL-NS pri ženskah, starih 35 let in več;
- če boste test naročili zaradi CIN 1, je vseeno, ali to zapišete na staro ali novo napotnico;
- novo napotnico uporabite tudi takrat, ko boste test naročili pri ženskah po zdravljenju zaradi CIN.

Nekateri ste nas že povprašali, ali lahko naročite test HPV tudi pri tistih pacientkah, ki so bile **zdravljene zaradi CIN pred 1. oktobrom 2011.**

Glede na to, da naj bi tem pacientkam še 10 let po zdravljenju pregledovali BMV enkrat letno, lahko pri vseh poleg kontrolnega BMV naročite tudi triažni test HPV. Če bosta izvida obeh preiskav (BMV in triažni test) negativna, ravnate skladno z novimi smernicami in naredite ponovni BMV in triažni test čez eno leto. Če bosta oba izvida ponovno negativna, pacientko vrnete v redno 3-letno presejanje (že prej in ne šele po 10 letih).



Izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.

Priloga: Prenovljena napotnica za triažni test HPV